



いわき市

第78回新型コロナウイルス感染症対策本部会議

市長囲み取材

令和4年4月8日




いわき市

案件

新型コロナウイルス感染症の感染状況等について

新規感染者数と人口10万人対比の推移



直近2週間の状況

陽性判明日	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
陽性者数	90	76	53	38	65	83	92	89	110	91	57	103	114	145
うち行政検査	35	34	26	16	27	31	43	53	36	35	40	40	32	82
うち保険診療	55	42	27	22	38	52	49	36	74	56	17	63	82	63
人口10万人対比	125.47	134.30	131.56	136.13	146.49	146.18	151.36	151.05	161.41	172.98	178.77	190.34	199.78	215.92

新型コロナウイルス感染症の感染事例について

マスクなしでの接触や、市外との往来による感染拡大が確認

- 【事例1】 マスクができない乳幼児の活動での感染
- 【事例2】 普段一緒にいない祖父母とお孫さんとのマスクなしでの会話等による感染
- 【事例3】 居酒屋等での、マスクなしでの長時間の飲酒・会話による感染
- 【事例4】 マスクなしでの密接した部活及び運動前後の更衣室での会話による感染
- 【事例5】 県外の学校への通学を開始し、学校で感染する等、市外との往来を伴う感染

新型コロナウイルスワクチン **3回目接種**について



1

「ファイザー→ファイザー→モデルナ」は、**抗体価の上昇が「大」**。

2

感染した際の**発症予防、重症化予防に効果があります**。



3


感染予防にも一定の効果が期待できます。

オミクロン株に対するモデルナ社ワクチンの感染予防効果は、3回目接種から14～60日経過後で71.6%、61日経過後以降は47.4%とのデータがあります。

[出典:令和4年3月24日 第31回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料]

4

2回目接種から**6か月以上経過している方が接種**できます。



重症化しやすい高齢者、アレルギーをお持ちの方や乳幼児などのワクチン接種ができない方に感染を広げるリスクを減らすためにも**早めの接種**をお願いします。(種類よりもスピード！)