

1 服用不適項目確認

今までに、安定ヨウ素剤の成分、またはヨウ素に対し、過敏症があると言われたことがある人が配布対象者にいる。
 もしくは、ポピオンヨード液（うがい薬等に含まれる成分）及びビルゴール液使用後並びにヨウ化カリウム丸服用後にじんま疹、呼吸困難状態、血圧低下などのアレルギー反応を経験したことがある人が配布対象者にいる。

該当する者が配布希望者にいる
 はい いいえ

該 当 者 氏 名

※ 上記に該当する方に対しては、重篤な副作用が生じる可能性があるため、
安定ヨウ素剤をお渡しすることが出来ません。
 ※ 緊急時には一般の方よりも早い段階での避難が必要となりますので、
 避難方法等について事前にご確認ください。

2 慎重服用項目確認

今までに、**ひとつでも**次の病気と言われたことがあるひとが配布希望者の中にいる。
 ①ヨード造影剤過敏症（造影剤アレルギー）
 ②甲状腺の病気
 （甲状腺機能亢進症、機能低下症）
 ③腎臓の病気や腎臓機能障害
 ④先天性筋強直症
 ⑤高カリウム血症
 ⑥低補体血症性蕁麻疹用血管炎
 ⑦肺結核（カリエス、肋膜炎なども含む）
 ⑧ジューリング疱疹状皮膚炎

該当する者が配布希望者にいる
 はい いいえ

該 当 者 氏 名	病気No.

現在、次の**いずれかの**薬剤を使用している人が配布希望者の中にいる。
 ①カリウム含有製剤（カリウム補給等）
 ②リチウム製剤
 （双極性障害（躁うつ病）治療等）
 ③抗甲状腺剤（甲状腺機能低下症治療等）
 ④アンジオテンシンⅡ阻害剤、
 カリウム貯留性利尿剤、
 降圧剤、ACE阻害剤（高血圧症治療）

該当する者が配布希望者にいる
 はい いいえ

該 当 者 氏 名	薬No.

※ ひとつでも上記に該当する項目がある場合、安定ヨウ素剤の服用について、
あらかじめかかりつけ医と相談してください。